



โรคพิษสุนัขบ้า ติดเชื้อถึงตาย ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

คนติดเชื้อจากการถูกสัตว์ที่มีเชื้อ กัด บ้วน เลี้ยวบาดแผล สัตว์นำโรคที่พบมากที่สุด คือ สุนัข และแมว
หลังจากถูกกัด 3 สัปดาห์ ถึง 4 เดือน จะเริ่มแสดงอาการถ้ารับวัคซีนไม่ทัน



อาการในคน

“สิ้นหายใจ”
“น้ำลายไหล”
“กระวนกระวาย”
“ตื่นเต้น ก้าวร้าว”
“กัดแกะสิ่งของ กัดกรง อาจเชื่องซึม เสียงเห่าหอนเปลี่ยนไป”
“บ้วน คล้ายมีอะไรอยู่ในลำคอ”
“การเคี้ยว หรือกลืนผิดปกติ”
“ทรงตัวไม่ได้”

นอนนิ่งเป็นอัมพาต และตายในที่สุด

อาการในสัตว์

1

ป้องกัน 3 ขั้นตอน

ป้องกันสัตว์เป็นโรค

- พาสุนัขหรือแมวฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเมื่ออายุ 2-3 เดือน และฉีดซ้ำตามนัด
- ลดจำนวนสุนัข โดยการทำหมัน
- พบสัตว์สงสัย แจ้ง อสม. หรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที



2

ป้องกันการถูกกัด

- เลี้ยงในบ้าน ใส่สายจูง ไม่ให้ไปกัดคนอื่น
 - หลีกเลี่ยงไม่ได้ถูกกัด ด้วยคาถา 5 ย.
- คาถา 5 ย.** อย่าแหย่ อย่าเหยียบ อย่าแยก อย่าหยิบ อย่ายุ่ง



3

ป้องกันหลังถูกกัด



- ❌ **ข้อห้ามในการดูแลบาดแผล**
- ห้ามถู หรือฟอกบาดแผลด้วยความรุนแรง
- ห้ามใช้รองเท้าดี เพราะนอกจากบาดแผลจะเข้าเชื้อโรคอื่น ๆ ก็จะไปสู่บาดแผล
- ห้ามทาครีมบริเวณบาดแผล

DDC 1422
กรมควบคุมโรค





กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

โรคพิษสุนัขบ้า รักษาไม่หาย ป้องกันได้ด้วย คาถา 5 ย.



ย.1 อย่าแหยม

ไม่แหยมสุนัขให้โมโห

ย.2 อย่าเหยียบ

ไม่เหยียบ (หาง ตัว ขา) สุนัข
ไม่ทำให้สุนัขเจ็บหรือตกใจ



ย.3 อย่าแหยก

ไม่ไปแหยกสุนัข
ที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า



ย.4 อย่าหยิบ

ไม่หยิบจานข้าว
ขณะสุนัขกำลังกินอาหาร



ย.5 อย่ายุ่ง

ไม่ยุ่ง หรือคลุกคลีกับสุนัขนอกบ้าน



**คำแนะนำ
สำหรับ
คนเลี้ยงสุนัข**

1. นำสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี
2. ไม่ปล่อยสุนัขไปเล่นพ่วนในที่สาธารณะ
ทุกครั้งที่พาสุนัขออกนอกบ้านต้องใส่สายจูง
3. ไม่นำสุนัขไปปล่อย และต้องหาหมั่น
ไม่ให้มีสุนัขมากเกินไป

สถานที่ให้คำปรึกษาปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า



- ☎ สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422
- ☎ คณะสัตวแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ทุกมหาวิทยาลัย
- ☎ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และปศุสัตว์จังหวัด
- ☎ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และปศุสัตว์อำเภอ
- ☎ โรงพยาบาล และสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง

แสกนเพื่อรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม



SCAN ME



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control



ทำอะไรเมื่อถูก สุนัขกัด ?



ล้างแผล

ล้างแผลทันที ฟอกสบู่หลาย ๆ ครั้ง
ล้างเบา ๆ ล้างนาน ๆ 10-15 นาที
เช็ดแผลให้แห้ง

ใส่ยา

ทาแผลด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ควรใช้
เบตาดีน ถ้าไม่มีใช้แอลกอฮอล์ 70%
หรือทิงเจอร์ไอโอดีน



กักหมา

จดจำสัตว์ที่กัดให้ได้ เพื่อหาเจ้าของ
และสอบถามประวัติการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และกักหมาแมวไว้ ดูอาการ 10 วัน

หาหมอ

รีบไปพบแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ทันที พร้อมให้ประวัติ
การฉีดวัคซีนที่ผ่านมา



ฉีดวัคซีนต่อให้ครบชุด

หากมีนัดฉีดวัคซีนต้องไปให้ ครบและตรงตามนัด
ทุกครั้ง จึงจะมีประสิทธิภาพในการป้องกัน

สถานที่ให้คำปรึกษาปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า

แสกนเพื่อรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม



- ☎ สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422
- ☎ คณะสัตวแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ทุกมหาวิทยาลัย
- ☎ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และปศุสัตว์จังหวัด
- ☎ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และปศุสัตว์อำเภอ
- ☎ โรงพยาบาล และสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง



SCAN ME