

โรคติดเชื่อไวรัสซิกา แพร่ระบาดอย่างไร



ยุงลาย

ยุงลายเพศเมียเมื่อผสมพันธุ์แล้ว จะต้องการเลือด เพื่อพัฒนาไข่ยุง และวางไข่ เพื่อแพร่พันธุ์



ผู้ป่วย

ติดเชื่อไวรัสซิกา

หากยุงลายกัดผู้ป่วยก็จะได้รับเชื่อไวรัสซิกา



ยุงลาย

มีเชื่อไวรัสซิกา

หากไปกัดคนอื่นๆ จะทำให้ติดเชื่อไวรัสซิกา และเกิดการระบาดในวงกว้าง



คนทั่วไป

หากติดเชื่อไวรัสซิกา มีอาการไม่รุนแรง สามารถแพร่เชื่อผ่านยุงกัด และทางเพศสัมพันธ์



วางไข่



คนท้อง

เมื่อติดเชื่อไวรัสซิกา อาจมีผลกระทบต่อทารกในครรภ์ ซึ่งเชื่อสามารถติดต่อจากแม่สู่ลูกทางสายสะดือ เด็กที่คลอดออกมาอาจมีภาวะเสียงศีรษะเล็กตั้งแต่แรกเกิด และมีผลต่อพัฒนาการทางสมองและสติปัญญา ในระยะยาว



เมื่อยุงลายมีเชื่อไวรัสซิกา เชื้อนั้นจะอยู่จนหมดอายุขัย



ยุงลายที่มีเชื่อไวรัสซิกา เมื่อวางไข่ สามารถแพร่เชื่อไวรัสซิกา ไปสู่รุ่นลูกได้



อาการโรคติดเชื่อไวรัสซิกา



มีจุดแดงเล็ก ๆ ขึ้นตามตัว



มีไข้



ตาแดง



ปวดตามข้อ



ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ

หากมีอาการสงสัยติดเชื่อไวรัสซิกาให้รีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลทันที



โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

อาการ



ปวดข้อ
ปวดกล้ามเนื้อ



ผื่นแดง



มีไข้
ปวดศีรษะ



ตาแดง



กลุ่มเสี่ยง

หญิงตั้งครรภ์

เสี่ยงทารกแรกเกิด

- ศีรษะเล็ก
- พัฒนาการช้า
- ตัวเล็กผิดปกติ

ข้อควรระวัง



หากมีอาการ
ให้รีบพบแพทย์

ห้ามใช้ยาในกลุ่ม NSAIDs



- ยาแอสไพริน
- ยาไอบูโพรเฟน
- ยาไดโคลฟีแนค

การป้องกัน



กำจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย
ด้วยวิธี 3 เก็บ



เก็บบ้าน



เก็บขยะ



เก็บน้ำ